



# Insecticida



**Producto:** **COMPO Fazilo Insecticida Efecto Máximo**

## Ventajas del producto

- Para las plantas:**
- Es un producto de listo uso diseñado para ser utilizado únicamente en el ámbito de la jardinería doméstica. El producto, que actúa por contacto e ingestión, presenta una excelente actividad insecticida y acaricida frente a los ácaros insectos chupadores y masticadores que se combaten por su rápido efecto de derribo.
  - Se aplica en plantas ornamentales cultivadas en macetas situadas en interiores, en balcones, en invernaderos, en jardines, interiores de las viviendas y oficinas.

Cultivos	Plagas	Plazo de Seguridad
Arbustos ornamentales y Ornamentales herbáceas	Pulgones, cochinillas, mosca blanca y ácaros	No procede

- Para el usuario:**
- Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta.
  - **Consejos de prudencia:** Manténgase fuera del alcance de los niños. Conservar separado de alimentos, bebidas y piensos. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico, si es posible enseñándole esta etiqueta. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles.

## Características Técnicas

**Tipo de Producto:** Insecticida-acaricida líquido

**Composición:** Abamectina 0,0015%, Piretrinas 0,02%

**Tamaños de envase:** 750 ml.



# Insecticida



**Producto:** **COMPO Fazilo Insecticida Efecto Máximo**

## Aplicación

### Modo de empleo:

- **Generales:**
  - COMPO Insecticida Efecto Máximo se aplica en pulverización foliar directamente sin diluir.
  - El producto se pulveriza sobre las plantas infestadas hasta que las hojas queden visiblemente mojadas.
  - Se debe tratar también la superficie inferior de las hojas.
  - La aplicación de COMPO Insecticida Efecto Máximo se debe realizar cuando aparecen los primeros síntomas o plagas en las plantas.
  - Se recomienda realizar entre 1-3 tratamientos para obtener resultados óptimos con un intervalo de tratamiento es de 7-10 días.
  - El número máximo de tratamientos es de 3 por infestación así como para nuevas infestaciones.
  
- **Específicos:**
  - En días muy calurosos el tratamiento se debe realizar por la tarde para evitar producir daños a las planta ornamentales.
  - Si el producto se va a aplicar sobre plantas en floración, realizar previamente una prueba sobre una de las plantas antes del tratamiento.
  - No tratar las siguientes especies si se encuentran en floración: Orquídeas, violeta africana, alegría del hogar, primorosa y begonias.

### Período de utilización:

Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.

Ideal	Posible	No Aconsejable